

## INFORMATIONEN ZUM RICHTIGEN AUSFÜLLEN DES FORMULARS

- AN: Attachment Niveau = ST+ GN
- SONDIERUNGSTIEFE (ST): notieren Sie Messungen  $\geq 4$  mm an jeweils 6 Seiten des Zahnes.
- GN (GINGIVANIVEAU): Abstand des Margo gingivae von der Schmelzzementgrenze in mm, gemessen auf der gleichen Stelle wie die ST. Im Falle einer Rezession mit positiven Werten; Bei einer Hyperplasie mit negativen Werten;
- FURKATIONEN: Grad I: horizontaler Attachmentverlust im Furkationsgebiet  $\leq 3$  mm  
Grad II: horizontaler Attachmentverlust  $> 3$  mm aber nicht durchgängig  
Grad III: durchgängige Furkation
- MOBILITÄT: 0: physiologisch  
1: 0,2-1 mm horizontal  
2: 1-2 mm horizontal  
3:  $> 2$  mm horizontal oder vertikal
- BLUTUNG: markieren Sie Blutung auf Sondieren mit •
- PLAQUE: notieren Sie Zahnbelag am Gingivarand mit +
- pack-years: gibt Auskunft über die Menge von insgesamt über die Zeit konsumierten Zigaretten, wobei 20 Zigaretten/Tag x 1 Jahr = 1 pack-year  
20 Zig/Tag x 10Jahre = 10 pack-years  
40 Zig/Tag x 1Jahr = 2 pack-years  
10 Zig/Tag x 1Jahr = 0,5 pack-year usw.

## ZAHNBEZOGENE DIAGNOSE:

### GINGIVITIS: (G)

-ST  $\leq 3$  mm

oder bis 4 mm ohne Attachmentverlust  
u. Blutung nach Sondieren

### PARODONTITIS: (P)

-ST  $\geq 4$  mm

-Blutung nach Sondieren  
-Attachmentverlust,  
-Knochenverlust

### PARODONTITIS MIT KOMPLIKATIONEN (P+K):

-ST  $\geq 4$  mm

-Blutung nach Sondieren

-Attachmentverlust

-einer oder mehrere der folgenden Befunde: -Knochenverlust  $>$  als die Hälfte der Wurzellänge  
-vertikale Knochendefekte  
-Mobilitätsgrad II o. III  
-Furkationsbefall Grad II o. III

## ZAHNBEZOGENE PROGNOSE:

+: gut voraussagbares Behandlungsergebnis

±: fraglich

-: unbehandelbar